

БИОЭКОЛОГИЯ СЕВЕРНОЙ ПОПУЛЯЦИИ СЛИВОВОЙ ПЛОДОЖОРКИ *Grapholitha funebrana* Tr. (Lepidoptera: Tortricidae) В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНО-НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РОССИИ

А.С. ЗЕЙНАЛОВ

Изменение климата, в том числе устойчивое повышение температуры в северных широтах, приводит к существенным изменениям в экосистемах. В северном направлении расширяются ареалы сельскохозяйственных культур, выращиваемых ранее в южной и средней зоне России. Вместе с ними на новые территории проникают опасные вредители, например сливовая плодовая жорка *Grapholitha funebrana* Tr. При массовом повреждении растений сливы этим вредителем потери урожая достигает 80 % и более. Для обеспечения рентабельности производства требуется проводить не менее 3-4 обработок за вегетационный сезон. Применяют как химические, так и экологически безопасные методы защиты, в том числе половые феромоны фитофага. Для успешной защиты сливы от плодовой жорки необходимо подробно изучить биологические и экологические особенности развития вредителя в конкретной зоне его распространения. В Центрально-Нечерноземной зоне такие исследования ранее не проводились. Мы впервые установили, что сливовая плодовая жорка широко распространилась в Центрально-Нечерноземной зоне и развивается здесь в двух поколениях. Целью работы было изучение биоэкологии вредителя в Центрально-Нечерноземной зоне и динамики развития фитофага в течение вегетационного сезона. Исследования проводили в плодоносящих насаждениях сливы Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства (ВСТИСП, Ленинский р-н, Московская обл.) в 2015-2017 годах. Динамику лёта *G. funebrana* отслеживали с помощью феромонных ловушек. Для привлечения самцов использовали феромонный препарат Денацил-П (АО «Щелково Агротех», Россия). Для установления срока начала откладки яиц самками через 2 сут после вылета первых бабочек с 10 деревьев, равномерно распределенных по двум диагоналям насаждения, отбирали 400 листьев и столько же завязей (после их образования). Отбор осуществляли ежедневно (по 10 шт. с четырех сторон каждого учетного дерева). Начало отрождения гусениц устанавливали, ежедневно осматривая по 400 завязей, начиная с 4-х сут после обнаружения первых яиц фитофага. Установлено, что в условиях Центрально-Нечерноземной зоны вредитель развивается не в одном, а в двух поколениях, на фоне накопления суммы эффективных температур (СЭТ) выше 10 °С в пределах 854-1124 °С. Это значительно ниже аналогичных показателей для лесостепной зоны Украины (1231-1353 °С). В отдельные годы второе поколение фитофага по численности превосходит первое. По наблюдениям в феромонных ловушках, начало лёта бабочек перезимовавшего поколения северной популяции *G. funebrana* сильно колеблется по годам в зависимости от погодных условий весеннего периода и отмечается при сумме эффективных температур от 59,4 до 159,8 °С, от начала цветения до образования завязей у сливы. Поэтому СЭТ и фенофазы развития растений не могут служить надежными ориентирами для прогноза начала лёта бабочек. В отличие от географических популяций *G. funebrana*, развивающихся в южной и средней зоне садоводства, бабочки северной популяции вредителя не прерывают лёта при среднесуточной температуре воздуха 11-14 °С. Проведенные исследования показывают, что в северной зоне садоводства защитные мероприятия следует планировать как против первого, так и против второго поколения сливовой плодовой жорки, что необходимо для предотвращения массового повреждения плодов и значительно снизит зимующий запас фитофага.

Ключевые слова: *Grapholitha funebrana* Tr., северные популяции, феромонные ловушки, сумма эффективных температур, динамика лёта.

Изменения климата, происходящие в последние десятилетия, а также удлинение вегетационного периода приводят к дисбалансу в среде обитания живых организмов, нарушая порядок взаимоотношений между ними (1-4). Погодные аномалии, повышение температуры, сдвиги в количестве осадков, вызывающие колебания других факторов среды, на которые живые организмы реагируют в зависимости от присущей им экологической пластичности и адаптационных возможностей, обуславливают качественно новые преобразования в экосистемах (5-8). Аналогичную динамику можно наблюдать и в агроэкосистемах, в том числе в насаждениях садовых культур. Влияние меняющегося климата на эти системы стало заметно с начала 1980-х годов (9-11).

Потепление климата, с одной стороны, способствует продвижению ряда культур, выращиваемых в южной и средней зоне садоводства, в северные регионы, с другой — приводит к проникновению на новые территории вредных организмов. В частности, в Центрально-Нечерноземной зоне происходят заметные изменения в биоэкологии фитофагов и патогенов, удлиняется период их вредоносности, появляются новые, нетипичные для региона вредители и патогены, активизируются те вредные организмы, которые ранее имели второстепенное значение. Появление новых сортов и модификации технологий выращивания благоприятствуют этому процессу (11-13).

Существенным метаморфозам подвергаются видовой состав вредных организмов сливы, степень их опасности и хозяйственная значимость. Так, поврежденность плодов сливовой плодовой жоржкой (*Grapholitha funebrana* Tr.) и потери урожая от этого фитофага в разных регионах (14, 15) — до 80 % и более, а для обеспечения рентабельности производства культуры приходится применять не менее 3-4 химических обработок за вегетационный сезон (16-19). Для регулирования численности и предотвращения потерь урожая от плодовой жоржки предлагаются экологичные методы борьбы, в том числе нарушение химических коммуникаций, феромонную дезориентацию и массовый отлов самцов (20-22), применение оофагов (23) на основе мониторинга популяций вредителей (24). Однако особенности биоэкологии и связанной с ней вредоносности фитофага в Центрально-Нечерноземной зоне до сих пор не изучены.

В настоящей работе мы впервые установили, что сливовая плодовая жоржка широко распространилась в Центрально-Нечерноземной зоне и развивается здесь в двух поколениях. Определены пределы суммы эффективных температур для начала вылета бабочек перезимовавшего поколения, формирования двух поколений, начала откладки яиц и отрождения гусениц вредителя. Установлена минимальная температура воздуха для активного лета бабочек северной популяции и динамика лета в течение вегетационного периода, которые значительно отличаются от показателей для южной зоны.

Нашей целью было изучение биоэкологии сливовой плодовой жоржки в Центрально-Нечерноземной зоне и оценка динамики развития этого фитофага в течение вегетационного сезона.

Методика. Обследования проводили в двух плодоносящих насаждениях сливы (лабораторный участок и демонстрационный сад) Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства (ВСТИСП, Ленинский р-н, Московская обл.) в 2015-2017 годах. Динамику лета *G. funebrana* отслеживали с помощью феромонных ловушек треугольной формы Атракон-А (АО «Щелково Агрохим», Россия) с размером клеевого вкладыша 10×17 см. Для привлечения самцов использовали феромонный препарат Денацил-П (АО «Щелково Агрохим», Россия), диспенсер — резиновая капсула, пропитанная действующим веществом (половым феромоном) Z8 (додецилацетат, 1 мг/диспенсер). Феромонные ловушки развешивали на высоте 2 м непосредственно перед цветением сливы сортов раннего срока созревания (Утро, Опал, Скороплодная). Диспенсеры пинцетом размещали в центре клеевого вкладыша, меняли через каждый 6 нед (клеевые вкладыши — по мере загрязнения). Осмотр феромонных ловушек и учет отловленных самцов до вылета первых бабочек проводили ежедневно, в конце лета II поколения (с начала II декады сентября) — через 1 сут, а в остальное время — 2-3 раза в неделю. До использования диспенсеры хранили в холодильнике.

Для установления срока начала откладки яиц самками через 2 сут

после вылета первых бабочек с 10 деревьев, равномерно распределенных по двум диагоналям насаждения, отбирали 400 листьев и столько же завязей (после их образования). Отбор осуществляли ежедневно, по 10 шт. с четырех сторон каждого учетного дерева. Образцы исследовали под микроскопом МБС-10 (ОАО «ЛЗОС», Россия). Начало отрождения гусениц устанавливали, ежедневно (начиная с 4-х сут после обнаружения первых яиц фитофага) просматривая по 400 завязей,

Вычисляли средние по датам наблюдений (выборочная средняя \bar{x}) и стандартное отклонение по каждому участку наблюдений (σ). Корреляцию между численностью отловленных самцов I и II поколений сливовой плодовой и суммами эффективных температур в период интенсивного лета (СЭТ 1 и СЭТ 2) анализировали по Б.А. Доспехову (25) с использованием пакета программы Microsoft Excel. Корреляции считали статистически значимыми при доверительной вероятности $P = 99 \%$.

Результаты. В период с конца 1980-х до начала 1990-х годов северной границей распространения *G. funebrana* считались 52° с.ш., а в пределах Орловской, Курской, Воронежской областей и северной части Белгородской области вредитель развивался в I поколении (26-28). Однако в настоящее время сливовая плодовая плодовая проникла и интенсивно развивается в Центрально-Нечерноземной зоне, в том числе в Московской области (55° с.ш.). Даже в условиях аномально холодного вегетационного сезона 2017 года (табл. 1) она давала не одно, а два поколения.

1. Показатели средней температуры и осадков за вегетационные периоды 2015-2017 годов в Ленинском районе Московской области (по данным метеостанции аэропорта Домодедово, Московская обл.)

| Параметр | Год | Месяц | | | | | |
|-------------------------|------|--------|------|------|------|--------|----------|
| | | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| Средняя температура, °С | | | | | | | |
| Многолетняя Фактическая | | 6,7 | 13,2 | 17,0 | 19,2 | 17,0 | 11,3 |
| | 2015 | 6,1 | 14,3 | 18,0 | 18,1 | 17,6 | 13,8 |
| | 2016 | 8,1 | 15,0 | 18,2 | 20,9 | 19,5 | 11,4 |
| | 2017 | 5,3 | 10,9 | 14,5 | 17,9 | 18,8 | 13,0 |
| Отклонение | 2015 | -0,6 | +1,1 | +1,0 | -1,1 | +0,6 | +2,5 |
| | 2016 | +1,4 | +1,8 | +1,2 | +1,7 | +2,5 | +0,1 |
| | 2017 | -1,4 | -2,3 | -2,5 | -1,3 | +1,8 | +1,7 |
| Осадки, мм | | | | | | | |
| Многолетние Фактические | | 37 | 50 | 80 | 85 | 82 | 68 |
| | 2015 | 44 | 119 | 94 | 121 | 14 | 88 |
| | 2016 | 34 | 63 | 61 | 122 | 167 | 59 |
| | 2017 | 79 | 84 | 140 | 105 | 68 | 38 |
| От многолетних, % | 2015 | 119 | 238 | 117 | 142 | 17 | 129 |
| | 2016 | 92 | 126 | 76 | 144 | 204 | 87 |
| | 2017 | 214 | 168 | 175 | 124 | 83 | 56 |

Безусловно, температурный режим, в частности сумма эффективных температур (СЭТ), оказывает доминирующее воздействие на темпы развития фитофага в разные фазы, но существенное влияние имеют также осадки, влажность и сочетания указанных факторов. Динамика развития сливовой плодовой в условиях стабильно теплой погоды в течение вегетации сглаживается. То есть для каждого поколения начало лета, один пик и снижение численности четко выделяются, как это отмечено в северной Италии, южной части Болгарии (29, 30), ряде регионов Чехии и Словакии (31). Разрабатываемые в этих условиях модели динамики развития плодовой относительно суммы эффективных температур хорошо коррелируют с фактической ситуацией в конкретной зоне (29), но не могут быть универсальными для регионов, где климатические и географические условия существенно различаются (31).

В северных регионах в зависимости от погодных условий года

наблюдается более сложная динамика развития *G. funebrana*, нередко с несколькими подъемами и снижением численности в период лёта одного поколения, что отмечается, начиная с лесостепной зоны Украины (30, 32). В отличие от южной и средней зоны садоводства, где суммы эффективных температур к началу лета бабочек перезимовавшего поколения имеют более или менее близкие показатели по годам, в Центрально-Нечерноземной зоне они сильно колеблются. В 1980-е годы лёт бабочек перезимовавшего поколения *G. funebrana* начинался при накоплении СЭТ выше 10 °С в пределах 105-120 °С (28). По данным И.В. Шевчука с соавт. (30), в условиях лесостепной зоны Украины бабочки перезимовавшего поколения вылетают при СЭТ 45,5-47,0 °С, а в Болгарии этот показатель составляет 32,6-67,6 °С. По сравнению с началом 1960-х годов в зоне северной лесостепи Украины бабочки вылетают на 33-36 сут раньше, а лёт завершается значительно позже, в начале или середине октября. Авторы связывают это с глобальными изменениями климата.


По нашим данным, в 2015 году СЭТ выше 10 °С к началу лета бабочек *G. funebrana* составила 159,8 °С (1 июня), в 2016 году — 86,9 °С (18 мая), в 2017 году — 59,4 °С (23 мая). Начало вылета бабочек также значительно варьировало по годам и приходилось на фенофазы начало цветения, окончание цветения или образование завязей у поздних сортов сливы Память Тимирязева, Ренклюд тамбовский, Алексей. Максимальный и минимальный показатели СЭТ за 3 года различались в 2,7 раза. Также варьировали по годам сроки начала откладки яиц самками вредителя (в 2015 году — 4 июня при СЭТ 185,6 °С, в 2016 году — 24 мая при СЭТ 105,4 °С, в 2017 году — 30 мая при СЭТ 102,6 °С) и начала отрождения первых гусениц (в 2015 году — 12 июня при СЭТ 240,1 °С, в 2016 году — 3 июня при СЭТ 191,2 °С, в 2017 году — 16 июня при СЭТ 147,7 °С).

С одной стороны, это указывает на высокую экологическую пластичность фитофага, оперативно реагирующего на фактические изменения окружающей среды и гармонизирующего свое развитие с оптимальными для себя условиями, с другой — на продолжение адаптации в пределах нового ареала. В условиях резких изменений погоды, присущих Нечерноземной зоне России, определение начала лёта сливовой плодовой жоржки только по СЭТ не гарантирует достаточно высокой точности и может служить, как и фенофаза развития растений, ориентиром для планирования, но не проведения защитных мероприятий. На динамику развития фитофага значительное влияние оказывают и другие климатические факторы, в том числе разность дневной и ночной температур, их значение и распределение по дням, интенсивность и продолжительность осадков, наличие и сила ветра и т.д. Более достоверные сведения о динамике лёта бабочек можно получить с помощью феромониторинга (20, 21), а мероприятия по защите урожая от вредителя должны проводиться по совокупности полученных данных (24), в том числе по результатам визуального наблюдения.

Лёт сливовой плодовой жоржки в 2015 году продолжался в течение 127 сут, в 2016 году — 136 сут, в 2017 году — 132 сут, то есть более чем 4 мес (рис.). Период вылета бабочек перезимовавшего поколения занимал около 1,5-2 мес. Через 3-5 сут после вылета самки приступали к откладке яиц. Продолжительность периода эмбрионального развития и развития гусениц в зависимости от условий погоды составила соответственно от 1 нед до 12 сут и от 17-20 сут до 1 мес. Известно, что развитие в стадии куколки происходит 1,5-2 нед, а продолжительность жизни бабочек в разных условиях колеблется от 4-5 до 15 сут (26-28).

При наличии одной генерации численность бабочек не могла зна-

чительно повыситься после середины августа—начала сентября, а лёт продолжится до начала октября. То есть в условиях Центрально-Нечерноземной зоны сливовая плодожорка давала за год не одно, а два поколения. Вторая генерация могла быть полной или факультативной в зависимости от сложившихся условий (погода и кормовая база).



Динамика лета сливовой плодожорки (*Grapholitha funebrana* Tr.) в 2015 (А), 2016 (Б) и 2017 (В) годах (численность в среднем на 1 ловушку) на лабораторном участке (а) и в демонстрационном саду (б) ($\bar{x} \pm \sigma$, Ленинский р-н, Московской обл.)

В 2015-2016 годах погодные условия благоприятствовали развитию I и II поколения *G. funebrana*, но период созревания и сбора урожая

наступил значительно раньше, чем в 2017 году. В этих условиях I поколение было более многочисленным. Это, в частности, объясняется и тем фактом, что даже в южных регионах от 25 до 55 % гусениц каждого поколения уходит на зимнюю диапаузу (разумеется, кроме последнего поколения, которое полностью диапаузирует) (28).

В 2017 году, несмотря на аномальные для этого периода холода до середины лета в сочетании с продолжительными сильными дождями (см. табл. 1), лёт бабочек, начавшийся 23 мая, продолжался непрерывно. Бабочки I (перезимовавшего) поколения достигли максимальной численности в феромонных ловушках в конце июня—начале июля (см. рис.). Относительно высокая численность колебалась в зависимости от погодных условий (с двумя пиками), но сохранилась до середины III декады июля. В дальнейшем она снижалась до середины I декады августа, достигнув своего минимума. Однако процесс не прерывался, а усиливался с началом лёта бабочек II (летнего) поколения. В этот период погода резко изменилась: осадков стало меньше, температура воздуха значительно превышала среднесезонные данные. В сложившихся условиях большая часть гусениц I поколения не диапаузировала, а дала начало II поколению сливовой плодовой жорки. В результате оно оказалось более многочисленным, чем I поколение. Наряду с изменением погоды этому способствовала обильная кормовая база, поскольку срок созревания и сбора урожая задержался примерно на 3 нед, а на поздних сортах плоды оставались до начала октября. Высокую численность бабочек II поколения (тоже с двумя пиками) отмечали до второй половины II декады сентября с изменениями в зависимости от погодных условий. В дальнейшем численность вредителя постоянно и резко снижалась, и последние бабочки были зафиксированы в конце сентября—начале октября.

В аномальных погодных условиях весны и первой половины лета 2017 года обнаружили некоторые важные особенности в биоэкологии вредителя. Бабочки сохраняли активность лёта при средней температуре воздуха 11-14 °С. В начале июня, когда среднесуточная температура воздуха опускалась ниже 10 °С и не поднималась выше 12,9 °С, они не прерывали лёт в отличие от традиционного вредителя в этой зоне яблонной плодовой жорки *Cydia (Laspeyresia) pomonella* L. (ее лёта не наблюдали).

Мы установили, что в Центрально-Нечерноземной зоне при накоплении СЭТ выше 10 °С до 854-1124 °С развивалось два поколения сливовой плодовой жорки — перезимовавшее и летнее. Аналогичные показатели для лесостепной зоны Украины — 1231-1353 °С (30), что подчеркивает высокую экологическую пластичность *G. funebrana*. При этом величина СЭТ 854 °С была зафиксирована в 2017 году, когда II поколение превзошло перезимовавшее по численности. Однако следует подчеркнуть, что в 2017 году СЭТ в период интенсивного лёта летнего поколения на 148,7 °С превышала значение СЭТ периода интенсивного лёта перезимовавшего поколения (в 2015 и 2016 годах — соответственно на 10 и 7,3 °С). Анализ множественной корреляции между численностью I и II поколений в период интенсивного лёта и соответствующими величинами СЭТ также показал более тесную связь между численностью летнего поколения и СЭТ 2 (табл. 2). Мы обнаружили средние по силе положительные корреляции между численностью I и II поколений, а также СЭТ I и численностью II поколения. При высокой СЭТ I (в пределах оптимальной температуры для фитофага 23-29 °С) развитие ускорялось и гусеницы, закончившие питание раньше, могли окукливаться и дать начало II поколению. Уменьшение

СЭТ 1 сдвигало формирование и созревание урожая на более поздние сроки, то есть влияло на кормовую базу (с учетом сортового фактора, активности энтомофагов и энтомопатогенов) и в сочетании с более высокой СЭТ 2 стимулировало окукливание гусениц и вылет бабочек II поколения.

**2. Корреляция между СЭТ 1, СЭТ 2 и численностью самцов сливовой пло-
дожорки (*Grapholitha funebrana* Tr.) I и II поколений (Московская обл.,
2015–2017 годы)**

| Показатель | I поколение | II поколение | СЭТ 1 | СЭТ 2 |
|--------------|-------------|--------------|---------|-------|
| I поколение | 1 | | | |
| II поколение | 0,4361* | 1 | | |
| СЭТ 1 | 0,3740* | 0,5741* | 1 | |
| СЭТ 2 | 0,2492 | 0,5923* | 0,4701* | 1 |

Примечание. СЭТ 1 и СЭТ 2 — суммы эффективных температур выше 10 °С в периоды интенсивного лёта бабочек I и II поколений.

* Корреляции статистически значимы при доверительной вероятности P = 99 %.

Конечно, особенности биоэкологического развития любого организма в условиях конкретной среды обитания определяются взаимодействием комплекса факторов, каждый из которых заслуживает особого внимания, но более существенную роль играют доминирующие. Используя данные по исходной численности фитофага и ее взаимосвязи с показателями СЭТ, можно прогнозировать и предварительно планировать необходимые защитные мероприятия, однако их кратность и конкретные сроки следует устанавливать с учетом результатов феромониторинга.

Таким образом, сливовая плодоярка *Grapholitha funebrana* Tr. в Центрально-Нечерноземной зоне России развивается не в одном, а в двух поколениях. Начало лёта бабочек перезимовавшего поколения зависит от погодных условий весеннего периода, сильно колеблется по годам и происходит при СЭТ выше 10 °С от 59,4 до 159,8 °С (от начала цветения до образования завязей сливы). Для развития двух поколений *G. funebrana* в Центрально-Нечерноземной зоне требуется СЭТ выше 10°С в пределах 854–1124 °С, а лёт бабочек может продолжаться при среднесуточной температуре воздуха 11–14 °С. Второе поколение *G. funebrana* в некоторые годы может превосходить по численности первое, что требует проведения соответствующих мероприятий по борьбе с вредителем, которые способствуют не только сохранению урожая и обеспечению высокого качества плодов, но и значительному снижению зимующего запаса фитофага.

ФГБНУ Всероссийский селекционно-технологический
институт садоводства и питомниководства,
115598 Россия, г. Москва, ул. Загорьевская, 4
e-mail: adzejnalov@yandex.ru ✉

Поступила в редакцию
6 апреля 2018 года

Sel'skokhozyaistvennaya biologiya [Agricultural Biology], 2018, V. 53, № 5, pp. 1080–1088

THE BIO-ECOLOGY OF NORTHERN POPULATIONS
OF THE PLUM MOTH *Grapholitha funebrana* Tr. (*Lepidoptera: Tortricidae*)
IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE IN THE CENTRAL
NECHERNOZEM ZONE OF RUSSIA

A.S. Zeynalov

All-Russian Horticultural Institute for Breeding, Agrotechnology and Nursery, Federal Agency for Scientific Organizations, 4, ul. Zagor'evskaya, Moscow, 115598 Russia, e-mail adzejnalov@yandex.ru (✉ corresponding author)

ORCID:

Zeynalov A.S. orcid.org/0000-0001-5519-2837

The author declares no conflict of interests

Received April 6, 2018

doi:10.15389/agrobiol.2018.5.1080eng

Abstract

Climate change over the last decades and rising global temperatures, especially in the Northern latitudes, affect ecosystems, including agricultural sector. The crops naturally grown in southern and central Russia are now expanding to northern areas along with dangerous pests that are not characteristic of these areas. Plum moth *Grapholitha funebrana* Tr. causes over 80 % yield losses. At least 3-4 treatments are required during the growing season to ensure the profitability. Chemical and environmentally friendly methods (pheromone traps) are of practical use. Anyway, successful protection requires detailed biological and ecological characterization of the pest in a specific area. In the Central Non Chernozem Zone of Russia such studies have not yet been conducted. This paper is the first evidence of *G. funebrana* wide spread in the Central Non Chernozem Zone where the pest can produce two generations. The study was carried out in the fruit-bearing plum plantations (All-Russian Horticultural Institute for Breeding, Agrotechnology and Nursery, Moscow Region, Leninskii district) in 2015-2017. Summer dynamics of *G. funebrana* population was monitored using pheromone traps with Denazil-P («Schelkovo Agrokhim», Russia) to attract moth males. Two days after the first plum moth butterflies fled, 400 leaves and the same number of ovaries (after their formation) were collected from 10 trees standing evenly along diagonals of the plantation to determine the start date of egg laying. From each tree the leaves and ovaries were collected daily from four sides (10 samples per side). The beginning of caterpillar hatching was determined by daily viewing 400 ovaries, starting from day 4 after the detection of the first eggs laid. Our survey shows that northern populations of *G. funebrana* are presently widely spread and successfully adapted outside 52° north latitude previously deemed the northern border of plum moth area. In Central Non-Chernozem Zone, particularly in the Moscow region (55° north latitude), the pest is capable to produce not one but two generations if sum of effective temperatures (SET) above 10 °C is 854-1124 °C. This is much lower than the value for the forest-steppe zone in Ukraine (1231-1353 °C). In some years the second *G. funebrana* generation exceeds the first generation in abundance. The start date of the overwintered generation flight varies greatly depending on the weather conditions during spring. The favorable sum of effective temperatures is from 59.4 to 159.8 °C which coincides with flowering and ovary formation in plum trees. So SET values and phenophases of plant development are not reliable reference points to forecast the beginning of the butterfly flight. Unlike geographical populations of *G. funebrana* from the southern and central zones of horticulture, butterflies of northern *G. funebrana* population remain active at daily air average temperature of 11-14 °C. This study indicates that in the northern gardening protective measures should be planned against both the first and second generation of plum fruit moth to prevent mass damage to fruits and to reduce the number of overwintering *G. funebrana* population

Keywords: *Grapholitha funebrana* Tr., northern populations, pheromone traps, the sum of effective temperatures, the dynamics of the flight.

REFERENCES

1. Menzel A. Trends in phenological phases in Europe between 1951 and 1996. *Int. J. Biometeorol.*, 2000, 44(2): 76-81 (doi: 10.1007/s004840000054).
2. Kozharinov A.V., Minin A.A. V sbornike: *Vliyanie izmeneniya klimata na ekosistemy* [In: Impact of climate change on ecosystems]. Moscow, 2001: 17-23 (in Russ.).
3. Delbart N., Picard G., Toan T.L., Kergoats L., Quengan S., Woodwand I., Dye D., Fedotova V. Spring phenology in Boreal Eurasia over a nearly century time scale. *Glob. Change Biol.*, 2008, 14(3): 603-614 (doi: 10.1111/j.1365-2486.2007.01505.x).
4. Thuiller W., Lavergne S., Roquet C., Boulangéat I., Lafourcade B., Araujo M.B. Consequences of climate change on the tree of life in Europe. *Nature*, 2011, 470(7335): 531-534 (doi: 10.1038/nature09705).
5. *Phenology and climate change*. X. Zhang (ed.). Croatia, 2012 (doi: 10.5772/2146).
6. Inсарov G.E., Borisova O.K., Korzukhin M.D., Kudеyаrov V.N., Minin A.A., Ol'chev A.V., Semenov S.M., Sirin A.A., Kharuk V.I. V sbornike: *Metody otsenki posledstviy izmeneniya klimata dlya fizicheskikh i biologicheskikh system* [In: Methods for assessing the effects of climate change on physical and biological systems]. Moscow, 2012: 190-265 (in Russ.).
7. *Phenology: an integrative environmental science*. M.D. Schwartz (ed.). Springer, Netherlands, 2013 (doi: 10.1007/978-94-007-6925-0).
8. IPCC Summary for policymakers. In: *Climate change 2014: Impacts, adaptation, and vulnerability. Part A: Global and sectoral aspects. Contribution of working group II to the fifth assessment report to the Intergovernmental Panel on climate change*. C.B. Field, V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, L.L. White (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, NY, 2014: 1-32.
9. Cahill A.F., Aiello-Lammens M.E., Caitlin F.M., Hua X., Karanewsky C.J., Ryu H.Y.,

- Sbeglia G.C., Spagnolo F., Waldron J.B., Wiens J.J. Causes of warm-edge range limits: systematic review, proximate factors and implications for climate change. *J. Biogeogr.*, 2014, 41(3): 429-442 (doi: 10.1111/jbi.12231).
10. Musolin D.L., Saulich A.Kh. *Materialy XV s"ezda Russkogo entomologicheskogoobshchestva* [Proc. XV Congress of the Russian Entomological Society]. Novosibirsk, 2017: 340-341 (in Russ.).
 11. Zeinalov A.S. *Uspekhi sovremennoi nauki*, 2017, 9(2): 94-100 (in Russ.).
 12. Zeinalov A.S., Griboedova O.G. *Sadovodstvo i vinogradarstvo*, 2016, 3: 35-40 (in Russ.).
 13. Koltun N., Yarchakovskaya S. Mass trapping of *Synanthedon tipuliformis* on blackcurrants and *Grapholithafunebrana* on plums with pheromone glue traps in Belarus. *Journal of Fruit and Ornamental Plant Research*, 2006, 14(Suppl. 3): 175-180.
 14. Shevchuk I.V., Satina G.M., Denisyuk A.F. *Vestnik zashchity rastenii*, 2014, 1: 53-58 (in Russ.).
 15. Ignatova E., Karpun N., Pyatnova Yu., Vendilo N. *Mezhdunarodnyi sel'skokhozyaistvennyi zhurnal*, 2015, 3: 60-63 (in Russ.).
 16. Andreev R., Kutinkova H. Possibility of reducing chemical treatments aimed at control of plum insect pest. Proc. IX International Symposium on plum and prune genetics, breeding and pomology (Palermo, Italy, March 16-19, 2008). *Acta Hortic.*, 2010, 874: 215-220 (doi: 10.17660/ActaHortic.2010.874.29).
 17. Sciarretta A., Trematerra P., Baumgärtner J. Geostatistical analysis of *Cydia funebrana* (Lepidoptera: Tortricidae) pheromone trap catches at two spatial scales. *American Entomologist*, 2001, 47(3): 174-184 (doi: 10.1093/ae/47.3.174).
 18. Nastas T. Al'ternativnye metody podavleniya chislennosti *Grapholitha funebrana* Tr. Științaagricolă, 2012, 1: 26-29.
 19. Tshova T., Subchev M. Circadian rhythm and female calling and mating behaviour in *Procrudinae* (Lepidoptera: Zygaenidae). *Acta Entomology Bulg.*, 2005, 11: 57-64.
 20. Subchev M., Tshova T., Koshio C., Franke S., Tröger A., Twele R., Franke W., Picket J.A., Wadhams L.J., Woodcock C.M. Identification and biological activity of sex pheromone components from females of the plum moth *Illiberis rotundata* Jordan (Lepidoptera: Zygaenidae: Procrudinae). *Chemoecology*, 2009, 19(1): 47-54 (doi: 10.1007/s00049-009-0008-8).
 21. Deribizov V.E. *Agro XXI*, 2010, 1-3: 6-7 (in Russ.).
 22. Pyatnova Yu.B., Kislitsyna T.I., Voinova V.N., Karakotov S.D., Pletnev V.A., Vendilo N.V., Lebedeva K.V., Velcheva N., Staneva E. *Zashchita i karantin rastenii*, 2013, 8: 33-35 (in Russ.).
 23. Tuca O., Stan C., Mitrea I. Monitoring the Flight of *Trichogramma dendrolimi* Mats. in a plum orchard in order to establish the setup scheme for the plates with *Anagasta kuhniella* Zell. Eggs. 2nd EUFRIN Plum and Prune-Working-Grupp meeting on present constraints of plum growing in Europe (Craiova, Romania: Jul 20-22, 2010). *Acta Hortic.*, 2012, 968: 161-166 (doi: 10.17660/ActaHortic.2012.968.22).
 24. Samietz J., Hoehn H., Razavi E., Schaub L., Graf B. Decision support for sustainable orchard pest management with the Swiss forecasting system SOPRA. 2nd International symposium on horticulture in Europe (SHE) (Angers, France: Jul 01-05, 2012). *Acta Hortic.*, 2015, 1099: 383-390 (doi: 10.17660/ActaHortic.2015.1099.44).
 25. Dospekhov B.A. *Metodika polevogo opyta* [Methods of field trials]. Moscow, 1985 (in Russ.).
 26. Migulin, A.A., Osmolovskii G.E., Litvinov B.M., Pokozii I.T., Pospelov S.M. *Sel'skokhozyaistvennaya entomologiya* [Agricultural entomology]. Moscow, 1983 (in Russ.).
 27. Bondarenko N.V., Pospelov S.M., Persov M.P. *Obshchaya i sel'skokhozyaistvennaya entomologiya* [General and agricultural entomology]. Moscow, 1983 (in Russ.).
 28. Vasil'ev V.P., Livshchits I.Z. *Vrediteli plodovykh kul'tur* [Pests of fruit crops]. Moscow, 1984 (in Russ.).
 29. Butturini A., Tiso R., Molinari F. Phenological forecasting model for *Cydiafunebrana*. *Bulletin OEPP*, 2000, 30(1): 131-136 (doi: 10.1111/j.1365-2338.2000.tb00865.x).
 30. Shevchuk I.V., Kutinkova Kh. *Vestnik zashchity rastenii*, 2011, 1: 51-55 (in Russ.).
 31. HrdyI., Kocourek F., Berankova J., Kuldova J. Temperature models for predicting the flight activity of local populations of *Cydiafunebrana* (Lepidoptera: Tortricidae) in Central Europe. *Eur. J. Entomol.*, 1996, 93: 569-578.
 32. Zeinalov A.S. *Plodovodstvo i yagodovodstvo Rossii*, 2017, XXXVIII(1): 107-110 (in Russ.).