doi: 10.15389/agrobiology.2021.5.885rus

		5	42	57	93	111	135	144	294	327	339	342	396	429	522	585	657	687	729	766	787	841	847	853	916	934	961	988	1105
Самоопыляемые	*S. lycopersicum* (cv. Hein7)	G	T	G	C	G	C	G	T	G	T	T	T	C	T	T	C	G	A	A	T	G	C	C	C	T	A	T	C
	S. pimpinellifolium (LA0480)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	A	.	.	.	.	.	.	.	.
	S. lycopersicum cv. Silvestre recordo (VIR1580)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	S. pimpinellifolium var. *racemigerum* (VIR1018)	.	.	.	T	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	S. galapagense (VIR3970)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	S. cheesmaniae (VIR3969)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	S. chmielewskii (VIR13725)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Перекрестноопыляемые	*S. neorickii* (VIR5033)	A	.	.	.	A	.	.	C	.	G	.	.	T	C	C	.	A	.	.	A	.	T	T	.	A	.	.	T
	S. chilense (VIR4300)	.	.	.	A	A	.	.	C	.	G	.	.	.	C	C	.	.	G	.	A	.	.	.	.	.	T	.	T
	S. peruvianum (VIR4361)	.	C	A	.	.	T	.	C	.	G	.	.	.	C	C	.	.	.	.	A	.	.	.	.	.	.	.	T
	S. peruvianum var *dentatum* (VIR3966)	.	.	.	.	A	.	.	C	.	G	.	.	.	C	.	.	.	.	.	A	C	.	.	.	.	.	.	T
	S. corneliomulleri (VIR4367)	.	.	A	.	A	.	.	C	.	.	.	C	.	C	.	T	.	.	.	A	.	T	.	.	.	.	.	T
	S. arcanum (VIR13958)	.	C	A	T	.	T	.	C	A	.	.	C	.	C	C	.	.	.	.	A	.	.	.	.	.	.	C	T
	S. arcanum (LA2157)	.	.	.	.	A	.	.	C	.	.	C	.	.	C	.	.	.	.	.	A	.	T	.	.	A	.	.	T
	S. habrochaites (VIR13964)	.	.	.	.	A	.	A	C	.	.	.	C	.	C	.	.	.	.	C	A	.	.	.	T	A	.	.	T

Рис. 2. Распределение SNPs в кодирующей области генов-гомологов *GME1* у изученных перекрестно- и самоопыляемых дикорастущих видов и сортов томата (*Solanum* L.). Числовыми значениями обозначено расположение однонуклеотидных замен. Описание видов и сортов см. в разделе «Методика» и в таблице 1.