

**Вспомогательные репродуктивные технологии, эмбриогенез**

УДК 636.2:591.39

doi: 10.15389/agrobiology.2022.6.1178rus

**ВЛИЯНИЕ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ ВЕЗИКУЛ Фолликулярного происхождения в среде созревания на способность ооцитов коров к эмбриональному развитию in vitro после старения и экстракорпорального оплодотворения\***Е.Н. ШЕДОВА<sup>1</sup>, Г.Н. СИНГИНА<sup>1</sup> ✉, S. UZBEKOVA<sup>2</sup>, R. UZBEKOV<sup>3</sup>, 4,  
В.А. ЛУКАНИНА<sup>1</sup>, Е.В. ЦЫНДРИНА<sup>1</sup>

Внеклеточные везикулы (extracellular vesicles, EVs), выделенные из фолликулярной жидкости (ФЖ) яичников, вовлечены in vivo в регуляцию мейоза в женских половых клетках, в связи с чем в последние годы EVs активно изучаются как потенциальные регуляторы качества ооцитов с целью повышения эффективности технологии получения эмбрионов in vitro (in vitro embryo production, IVP). В представленной работе мы впервые исследовали компетенцию к эмбриональному развитию у ооцитов коров (*Bos taurus*) при культивировании в присутствии EVs в процессе созревания и старении in vitro перед экстракорпоральным оплодотворением. Цель представленной работы заключалась в изучении влияния тестируемых условий на возрастные трансформации в зрелых ооцитах в процессе созревания in vitro (in vitro maturation, IVM) с точки зрения их способности после оплодотворения развиваться до стадии бластоцисты, а также качества получаемых IVP эмбрионов. EVs из ФЖ выделяли методом дифференциального ступенчатого центрифугирования и ультрацентрифугирования при 100 000 g. В полученной везикулярной фракции содержание общего белка составляло 37,5 мкг/мл ФЖ. Образцы проанализировали с использованием трансмиссионной электронной микроскопии, которая подтвердила наличие EVs, соответствующих по размерам экзосомам, в выделенных препаратах. Для функциональных экспериментов ооцит-кумуляусные комплексы (ОКК) культивировали с целью созревания в среде ТС-199, содержащей бычий сывороточный альбумин (3 мг/мл), пируват натрия (0,5 мМ) и эпидермальный фактор роста (EGF, 100 нг/мл) в отсутствие (контроль) или в присутствии EVs. Везикулярный белок добавляли в среду IVM в физиологической концентрации (на 1 мл среды количество EVs, выделенное из 1 мл ФЖ). Через 24 ч созревания ОКК переносили в среду старения и культивировали еще в течение 12 ч, после чего подвергали экстракорпоральному оплодотворению и культивированию для эмбрионального развития. На 3-и сут после оплодотворения изучали морфологию раздробившихся оплодотворенных ооцитов, на 7-е сут культивирования определяли число эмбрионов, развившихся до стадии бластоцисты, и их качество. Последнее оценивали на основании общего числа ядер в эмбрионах, которое подсчитывали с помощью цитологического анализа. Всего было проведено четыре независимых эксперимента. Число ОКК в каждой экспериментальной группе варьировало от 116 до 121. Доля раздробившихся после оплодотворения ооцитов в контроле была ниже, чем в опыте ( $53,5 \pm 2,9$  против  $63,8 \pm 2,9$  %,  $p < 0,05$ ). Также обнаружено положительное влияние EVs на развитие созревших и стареющих in vitro ооцитов до стадии бластоцисты после оплодотворения. В контроле выход бластоцист составлял  $17,3 \pm 1,6$  %. Присутствие в среде созревания EVs повышало этот показатель до  $26,5 \pm 0,7$  % ( $p < 0,05$ ), при этом качество полученных эмбрионов не ухудшалось. Полученные данные позволяют сделать вывод, что использование EVs из ФЖ яичников коров в процедуре IVM повышает устойчивость яйцеклеток к возрастным трансформациям и, как следствие, их компетенцию к эмбриональному развитию после старения in vitro и оплодотворения. Также очевидно, что EVs на этапе экстракорпорального созревания могут быть использованы для повышения эффективности технологии получения IVP эмбрионов у крупного рогатого скота.

**Ключевые слова:** фолликулярная жидкость, внеклеточные везикулы, ооциты, in vitro созревание, старение, эмбриональное развитие, крупный рогатый скот.

Биотехнология получения эмбрионов in vitro (in vitro embryo production, IVP), имеет широкие перспективы применения в научных исследованиях, а также служит одним из эффективных способов увеличения темпов генетического прогресса в селекции домашних животных, в том числе крупного рогатого скота (1). К настоящему времени достигнут существенный прогресс в совершенствовании этой технологии, однако качество эмбрионов, развившихся in vitro, по-прежнему значительно ниже, чем in vivo (2, 3). Один из лимитирующих факторов, влияющих на полноценность IVP

\* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 19-16-00115-П).

эмбрионов, — качество ооцитов, приобретаемое в процессе их созревания *in vitro* (*in vitro* maturation, IVM) (4, 5). При этом условия IVM все еще остаются субоптимальными и требуют детализации.

В стандартной практике модернизация систем созревания направлена в первую очередь на моделирование условий, имеющих место *in vivo* внутри овариальных фолликулов (5, 6). В среды культивирования ооцитов для улучшения их созревания добавляют разнообразные молекулярные факторы — гормоны, стероиды, ростовые факторы, жирные кислоты и различные метаболиты (7). Интерес к описанным веществам обусловлен их присутствием в фолликулярной жидкости (ФЖ) антральных фолликулов яичника, которая, в свою очередь, обеспечивает оптимальную среду для роста ооцитов, мейотического созревания и приобретения ооцитами компетентности для последующего эмбрионального развития (8). Воздействие перечисленных факторов проявляется в фолликулах яичника при тесной двунаправленной связи между ооцитом и окружающими их фолликулярными клетками (9, 10).

Недавние фундаментальные исследования выявили внеклеточные секреторные гранулы — внеклеточные везикулы (*extracellular vesicles*, EVs), включающие экзосомы и микропузырьки, в качестве новых участников межклеточных коммуникаций, которые секретируются клетками и переносят разные регуляторные факторы в другие клетки, способные поглощать эти EVs (11, 12). В фолликулах яичников коров EVs присутствуют в ФЖ (13). Они участвуют в переносе различных РНК, белков и липидов (14) и задействованы в регуляции мейоза в яйцеклетке и раннего развития эмбриона (15, 16). Таких участников межклеточных коммуникаций рассматривают как потенциальных регуляторов качества ооцитов и их компетенции к эмбриональному развитию в условиях *in vitro* и активно изучают в этом аспекте (17-19).

Следует также отметить, что существующие современные подходы к повышению эффективности технологии IVP эмбрионов учитывают изменения в функциональном состоянии ооцит-кумулясных комплексов (ОКК) в основном в процессе созревания ооцитов. Тем не менее у разных видов, включая *Bos taurus*, вслед за завершением первого деления мейоза в ооцитах инициируются процессы старения, которые негативно влияют на качество созревших яйцеклеток и их компетенцию к дальнейшему эмбриональному развитию (20, 21). В условиях *in vitro* яйцеклетки, выделенные из разных фолликулов яичника и от различных коров-доноров, представляют собой гетерогенную популяцию, которая неоднородна по потенциалу к развитию в процессе созревания *in vitro*. В результате культивирования *in vitro* часть ооцитов может созревать (достигать стадии метафазы II мейоза) значительно раньше, чем наступает период оплодотворения *in vitro*, что приводит к их более раннему старению, а также потере качества по сравнению с остальной популяцией созревающих клеток (22). При этом известно, что любая задержка в оплодотворении ооцитов может приводить к низкой жизнеспособности эмбрионов, а в случае рождения потомства — к ослаблению его фертильности и сокращению продолжительности жизни (20, 21, 23). При этом ассоциированные с ооцитом соматические клетки кумулюса, подвергающиеся апоптотической дегенерации при завершении созревания женских гамет, могут ускорять определенные негативные изменения, связанные со старением (23). На проблему быстрого старения ооцитов, которое происходит, в первую очередь, на молекулярно-цитоплазматическом уровне, все чаще обращают внимание при разработке научных подходов к модификации систем созревания ооцитов *in vitro* (24-26). Тем не менее участие EVs в

регуляции процессов старения до сих пор не установлено.

В представленной работе мы впервые исследовали компетенцию к эмбриональному развитию у ооцитов коров (*Bos taurus*) при культивировании в присутствии EVs в процессе созревания и старении *in vitro* перед экстракорпоральным оплодотворением.

Цель работы заключалась в изучении влияния тестируемых условий на возрастные трансформации в зрелых ооцитах в процессе IVМ с точки зрения их последующей способности развиваться до стадии бластоцисты, а также качество полученных эмбрионов.

*Методика.* Во всех экспериментах, кроме специально указанных случаев, использовали реагенты фирмы «Sigma-Aldrich» (США).

Для получения EVs из ФЖ выделенные *post mortem* яичники коров доставляли в лабораторию на льду, освобождали от окружающих тканей и многократно отмывали в стерильном охлажденном до +4 °С физиологическом растворе, содержащем 100 МЕ/мл пенициллина и 50 мкг/мл стрептомицина («БиоФармГарант», Россия). ФЖ аспирировали из антральных фолликулов диаметром 3-6 мм. По 2 мл ФЖ центрифугировали при 300 g (комнатная температура) в течение 15 мин, полученный супернатант, свободный от соматических клеток, переносили в новые стерильные пробирки. На следующем этапе ФЖ освобождали от апоптотических телец (размером 1-5 мкм) и крупных микровезикул (размером 200-1000 нм) центрифугированием соответственно при 2000 и 12000 g в течение 15 мин. EVs выделяли из очищенной ФЖ ультрацентрифугированием (центрифуга CS 150 NX, «Hitachi», Япония) в течение 90 мин при 100 000 g, после отбора супернатант разводили стерильным фосфатно-солевым буфером (ФСБ) (рН 7,4) и повторно ультрацентрифугировали при том же режиме. Осадки объединяли, разводили в 100 мкл ФБС и хранили при -80 °С до использования, предварительно отобрав от полученного объема две аликвоты по 5 мкл, которые использовали соответственно для определения количества EVs по концентрации белка и для ультраструктурного анализа препарата частиц с помощью трансмиссионной электронной микроскопии (ТЭМ).

Концентрацию белка измеряли на приборе Qubit 4 Fluorometer с использованием набора Qubit Protein Assay Kit («Thermo Fisher Scientific», США) и белкового стандарта Qubit с концентрацией от 0,125 до 5 мг/мл.

Для морфологического исследования 5 мкл суспензии EVs смешивали с 5 мкл 2 % раствора глутарового альдегида, предназначенного для электронной микроскопии (ЭМ) («Agar Scientific, Ltd.», Великобритания), и выдерживали в течение 1 ч при комнатной температуре. По 2 мкл суспензий фиксированных таким образом EVs наносили на никелевые ЭМ сеточки («Agar Scientific, Ltd.», Великобритания), покрытые формваровой пленкой с углеродным напылением, и инкубировали 60 мин во влажной камере, после чего сеточку промывали дистиллированной водой (3 раза по 10 с), нанося на поверхность каплю объемом 10 мкл и удаляя ее, касаясь краем сеточки фильтровальной бумаги. Далее проводили негативное контрастирование 2 % водным раствором уранилацетата («Electron Microscopy Science», США). Для этого на сеточку с препаратом EVs наносили каплю (10 мкл) уранилацетата, процедуру повторяли трижды с интервалом 10 с, после удаления последней капли сеточку сушили на воздухе. Препараты изучали с применением трансмиссионного электронного микроскопа JEOL 1011 («JEOL, Ltd.», Япония) и фотографировали (камера GATAN RIO 9, программа DigitalMicrograph3, «Gatan, Inc.», США). По результатам трансмиссионной электронной микроскопии устанавливали присутствие EVs в выделенных образцах и оценивали их морфологию.

Для экспериментов по получению IVF эмбрионов выделенные post mortem яичники коров доставляли с мясокомбината в лабораторию в теплом физиологическом растворе и препарировали, как описано выше. Ооцит-кумуляные комплексы (ОКК) выделяли из яичников, рассекая стенки фолликулов лезвием, промывали в среде ТС-199, содержащей 5 % фетальной бычьей сыворотки (ФБС), гепарин (10 мкг/мл) и гентамицин (50 мкг/мл) и проводили морфологическую оценку извлеченных ОКК. Для дальнейшего культивирования использовали ооциты округлой формы, с гомогенной цитоплазмой, равномерной по ширине зоной пеллюцида, окруженные несколькими компактными слоями клеток кумалюса.

Отобранные по качеству ОКК для *in vitro* созревания культивировали в 4-луночных планшетах («Биомедикал», Россия) группами (примерно 30 ооцитов) в 500 мкл среды ТС-199, содержащей 3 мг/мл бычьего сывороточного альбумина (БСА), 0,5 мМ пирувата натрия, 100 нг/мл эпидермального фактора роста EGF («Thermo Fisher Scientific», США) и 50 мкг/мл гентамицина в отсутствие (контроль) или в присутствии EVs. Везикулярный белок добавляли к среде созревания в физиологической концентрации (на 1 мл количество EVs, выделенное из 1 мл ФЖ). Капли среды покрывали 500 мкл легкого минерального масла. Культивирование проводили в инкубаторе при 38,5 °С и 5 % CO<sub>2</sub> в атмосфере. После 24 ч согласно процедуре IVF созревшие ОКК переносили в среду старения и культивировали еще в течение 10 ч. При пролонгированном культивировании применяли среду аналогичного состава, но без EVs.

После периода старения ОКК переносили в среду ВО-IVF («IVF Bioscience», Великобритания) для *in vitro* оплодотворения. Активные сперматозоиды, полученные методом swim-up, как описано ранее (26), добавляли в лунки с ооцитами (конечная концентрация 1×10<sup>6</sup> сперматозоидов/мл). Во всех экспериментах для оплодотворения использовали заморожено-оттаянную сперму одного и того же быка. Оплодотворение ооцитов *in vitro* происходило в 4-луночных планшетах («Биомедикал», Россия) в каплях среды объемом 500 мкл, покрытых 500 мкл минерального масла. Половые клетки совместно культивировали в течение 15-16 ч, затем ооциты освобождали от клеток кумалюса и налипших сперматозоидов, предполагаемые зиготы переносили в среду для развития эмбрионов (коммерческая среда ВО-IVC, «IVF Bioscience», Великобритания), капли полностью покрывали минеральным маслом и культивировали в инкубаторе при температуре 38,5 °С в присутствии 5 % CO<sub>2</sub>, 5 % O<sub>2</sub> и 90 % N<sub>2</sub> в атмосфере. Через 3-е сут после оплодотворения заменяли среду на свежую и проводили морфологическую оценку раздробившихся зигот, на 7-е сут культивирования оценивали число эмбрионов, развившихся до стадии бластоцисты.

Качество эмбрионов оценивали цитологически по общему числу ядер. Для этого 7-суточные эмбрионы фиксировали 4 % раствором параформальдегида в натрий-фосфатном буфере в течение 60 мин при комнатной температуре. После фиксации эмбрионы пермеабилizировали в течение 30 мин в 0,1 % растворе цитрата натрия, содержащем 0,5 % Тритона X-100, затем окрашивали в течение 20 мин раствором DAPI (1 мкг/мл) с целью локализации ядер, переносили на сухое обезжиренное стекло и заключали в среду Vectashield («Vector Laboratories», Великобритания). Для микрофотографирования и оценки препаратов использовали моторизованный микроскоп Axio Imager M2 («Carl Zeiss», Германия) с флуоресцентной приставкой и программу ZEN 2 pro («Carl Zeiss», Германия).

Статистическую обработку данных проводили методом ANOVA при помощи компьютерной программы SigmaStat («Systat Software, Inc.», США).

Результаты экспериментов представлены в виде средних значений ( $M$ ) и стандартных ошибок ( $\pm SEM$ ). Для оценки достоверности различий между сравниваемыми средними использовали критерий Тьюки. Различия считали статистически значимыми при  $p < 0,05$ .

*Результаты.* Экстракорпоральное созревание представляет собой важный этап IVP технологии. Тем не менее компетенция к эмбриональному развитию ооцитов, созревающих *in vitro*, по-прежнему остается значительно более низкой, чем при созревании *in vivo* (4, 5). Изучение характера и механизмов влияния физиологических факторов, в первую очередь естественного фолликулярного происхождения, в регуляции качества ооцитов в период их созревания *in vitro* может способствовать решению этой проблемы (5-7).


Ранее многими авторами, а также в наших собственных исследованиях было показано, что присутствие EVs, выделенных из ФЖ (которая *in vivo* служит естественным окружением женских половых клеток) в среде созревания ооцитов *in vitro* увеличивает их способность к эмбриональному развитию до стадии бластоцисты после оплодотворения (27, 28), ускоряет развитие эмбрионов (17), а также улучшает их качество, в том числе за счет снижения частоты апоптоза в бластомерах (27-29). Возможным механизмом такого позитивного эффекта могло быть увеличение устойчивости созревших яйцеклеток к возрастным изменениям, возникающим в период, который предшествует активации ооцитов спермием, и снижающим способность оплодотворенных ооцитов к эмбриональному развитию (22).

Для проверки этого предположения в представленной работе выделенные *post mortem* ооциты коров культивировали в среде IVM в отсутствие (контроль) или в присутствии физиологической концентрации EVs фолликулярного происхождения (экспериментальная группа EVs) и провели сравнительную оценку влияния исследуемых условий на возрастные трансформации в зрелых ооцитах в процессе их созревания *in vitro* с точки зрения способности после последующего старения и экстракорпорального оплодотворения достигать доимплантационных стадий развития. Для изучения изменений, связанных со старением ооцитов, мы использовали модель пролонгированного культивирования (20, 21), согласно которой в контрольной и экспериментальной группах ОКК после периода созревания *in vitro* (24 ч) перед оплодотворением *in vitro* дополнительно культивировали еще в течение 10 ч. Для чистоты эксперимента ОКК как в период созревания, так и в течение последующего старения культивировали в среде TCM-199, дополненной 3 мг/мл БСА, 0,5 мМ пируватом натрия и 100 нг/мл EGF, то есть не содержащей гонадотропных гормонов и сыворотки.

В эксперименте мы провели выделение EVs из фолликулов сорока коровьих яичников и охарактеризовали препараты по содержанию в них везикулярного белка с подтверждением присутствия в образцах EVs с помощью ТЭМ. Методология выделения EVs из жидкости фолликулов коров была основана на дифференциальном ступенчатом центрифугировании и ультрацентрифугировании при 100 000 g. Как показывает практика (17, 19), эта методология эффективна при получении фракции EVs, представляющей собой в основном экзосомы размером от 30 до 150 нм. Описанная методика была впервые предложена для выделения EVs из жидкости яйцевода (30, 31) и использована нами в частичной модификации (19).

В результате на 1 мл ФЖ мы выделили 37,5 мкг везикулярного белка. Общий пул, собранный со всего объема ФЖ, был проанализирован с использованием ТЭМ, которая подтвердила наличие везикул типа экзосом в

образце, что обусловило возможность его использования в функциональных экспериментах. На рисунке 1 представлен типичный вид везикул, полученных из ФЖ яичников коров (диаметр фолликулов 3-6 мм). Наблюдаются как единичные, так и агрегированные везикулы.



**Рис. 1.** Ультраструктура внеклеточных везикул (EVs) из фолликулярной жидкости яичников коров (*Bos taurus*) (трансмиссионная электронная микроскопия, JEOL 1011, «JEOL, Ltd.», Япония; камера GATAN RIO 9, «Gatan, Inc.», США; программа DigitalMicrograph3, «Gatan, Inc.», США).

Для оценки влияния EVs в период IVM на компетенцию ооцитов к эмбриональному развитию после старения *in vitro* мы провели четыре независимых эксперимента с использованием везикулярного белка, полученного за одно выделение. Результаты оценки представлены в таблице 1. Доля раздробившихся зигот (рис. 2, А, Г), определяемая на 3-и сут после оплодотворения *in vitro* в контроле была ниже, чем в опыте ( $53,5 \pm 2,9$  против  $63,8 \pm 2,9$  %,  $p < 0,05$ ). Также для созревших и стареющих *in vitro* ооцитов обнаружено положительное влияние EVs на развитие до стадии бластоцисты (табл. 1, рис. 2, Б, Д). В контроле выход бластоцист составлял  $17,3 \pm 1,6$  % (см. табл. 1, рис. 2, Б). Присутствие в среде созревания EVs повышало этот показатель до  $20,2 \pm 2,5$  % ( $p < 0,05$ ) (табл. 1, рис. 2, Д). Тенденция сохранялась и в случае расчета данного показателя от общего числа образовавшихся эмбрионов ( $41,8 \pm 1,2$  против  $32,3 \pm 1,9$ ,  $p < 0,05$ ).

**1. Развитие эмбрионов, полученных по технологии IVP (in vitro production) после созревания ооцитов коров (*Bos taurus*) в отсутствие (контроль) и в присутствии внеклеточных везикул из фолликулярной жидкости (EVs) и старения в течение 10 ч ( $M \pm SEM$ )**

Группа	Ооциты		Ооциты, развившиеся до стадии бластоцисты, %	
	общее число	раздробившиеся после оплодотворения, %	от общего числа	от числа раздробившихся
Контроль	116	$53,5 \pm 2,9$	$17,3 \pm 1,6$	$32,3 \pm 1,9$
Evs	121	$63,8 \pm 2,9^*$	$26,5 \pm 0,7^*$	$41,8 \pm 1,2^*$


\* Различия с контролем статистически значимы при  $p < 0,05$ .

**2. Результаты цитологического анализа бластоцист после экстракорпорального оплодотворения ооцитов коров (*Bos taurus*), созревших в отсутствие (контроль) и в присутствии внеклеточных везикул из фолликулярной жидкости (EVs), при старении в течение 10 ч ( $M \pm SEM$ )**

Группа	Число		Среднее число ядер в бластоцистах
	экспериментов	бластоцист	
Контроль	4	20	$78,9 \pm 3,3$
Evs	4	32	$86,5 \pm 2,1$

Использование EVs существенно не изменяло качества IVP эмбрионов на стадии бластоцисты, которое оценивали по числу ядер на 7-е сут

после оплодотворения (табл. 2, см. рис. 2, В, Е). Согласно результатам цитологического анализа, этот показатель в сравниваемых группах был одинаковым и соответствовал исследуемой стадии развития (32).



**Рис. 2.** Микрофотографии эмбрионов крупного рогатого скота (*Bos taurus*) после *in vitro* оплодотворения ооцитов, созревших в отсутствие (а-в) и в присутствии (г-е) внеклеточных везикул из фолликулярной жидкости (EVs), при старении в течение 10 ч: а, г — раздробившиеся зиготы (увеличение  $\times 100$ ), б, д — эмбрионы, развившиеся до стадии бластоцисты (увеличение  $\times 100$ , микроскоп Eclipse Ti-U, «Nikon», Япония); в, е — окрашивание ядер в бластоцисте с помощью DAPI (синий цвет; цитологический препарат) (увеличение  $\times 400$ , микроскоп Axio Imager M2, «Carl Zeiss», Германия).

Старение ооцитов представляет собой сложный биологический процесс, который может привести к ряду изменений в структуре и функциональном состоянии ооцитов млекопитающих, включая повреждение ДНК, уменьшение скорости оплодотворения, нарушение структуры митохондрий, ранний апоптоз ооцитов и снижение способности к эмбриональному развитию (22, 26, 33, 34). В условиях *in vitro* изменения в ооцитах, связанные со старением, могут протекать как в период их созревания, так и в процессе оплодотворения, что может негативно влиять на развитие и качество IVP эмбрионов (25, 26, 34). Тем не менее, несмотря на необходимость решения проблемы старения ооцитов в условиях *in vitro*, исследований, направленных на поиск регуляторов, снижающих возрастные трансформации яйцеклеток, очень мало. К настоящему времени показана возможность торможения, по крайней мере частичного, процессов старения при воздействии на ооциты коров L-карнитина. Внесение этого вещества в среду созревания снижает уровень окислительного стресса и апоптоза в зрелых ооцитах в период их старения, а также увеличивает выход бластоцист с 20,9 (контроль) до 29,2 % (25). Кроме того, установлено, что гипофизарный гормон пролактин (ПРЛ) может специфически воздействовать на зрелый ооцит и повышать его устойчивость к процессам старения, в том числе связанным с потерей ооцитами компетенции к последующему эмбриональному развитию (26). При воздействии ПРЛ доля ооцитов, достигших стадии бластоцисты, увеличивалась по сравнению с контролем в 1,9 раза (соответственно 15,2 против 8,2 %). В представленной работе мы продемонстрировали, что EVs из ФЖ яичников коров во время созревания ооцитов могут также повышать их резистентность к возрастным изменениям и улучшать развитие эмбрионов *in vitro*. При этом, в отличие от L-карнитина и ПРЛ, присутствие EVs не только способствовало сходному повышению выхода бластоцист (с 17,3 до 26,5 %), но и улучшало результативность оплодотворения, увеличивая долю раздробившихся ооцитов с 53,5 до 63,8 %.

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод, что применение внеклеточных везикул (extracellular vesicles, EVs), выделенных из фолликулярной жидкости яичников коров, в процедуре *in vitro* созревания повышает устойчивость яйцеклеток к возрастным трансформациям и, как следствие, их компетенцию к эмбриональному развитию после старения *in vitro* и оплодотворения. Также очевидно, что EVs на этапе экстракорпорального созревания могут использоваться для повышения эффективности технологии получения ИВР эмбрионов у крупного рогатого скота.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Зиновьева Н.А., Полябин С.В., Чинаров Р.Ю. Вспомогательные репродуктивные технологии: история становления и роль в развитии генетических технологий в скотоводстве (обзор). *Сельскохозяйственная биология*, 2020, 55(2): 225-242 (doi: 10.15389/agrobiology.2020.2.225rus).
2. Sirard M.A. 40 years of bovine IVF in the new genomic selection context. *Reproduction*, 2018, 156(1): 1-7 (doi: 10.1530/REP-18-0008.).
3. Ferré L.B., Kjelland M.E., Taiyeb A.M., Campos-Chillon F., Ross P.J. Recent progress in bovine *in vitro*-derived embryo cryotolerance: impact of *in vitro* culture systems, advances in cryopreservation and future considerations. *Reproduction in Domestic Animals*, 2020, 55(6): 659-676 (doi: 10.1111/rda.13667).
4. Thompson J.G., Lane M., Gilchrist R.B. Metabolism of the bovine cumulus-oocyte complex and influence on subsequent developmental competence. *Society of Reproduction and Fertility supplement*, 2007, 64: 179-190 (doi: 10.5661/rdr-vi-179).
5. Wrenzycki C., Stinshoff H. Maturation environment and impact on subsequent developmental competence of bovine oocytes. *Reproduction in Domestic Animals*, 2013, 48(1): 38-43 (doi: 10.1111/rda.12204).
6. Stroebech L., Mazzoni G., Pedersen H.S., Freude K.K., Kadarmideen H.N., Callesen H., Hyttel P. *In vitro* production of bovine embryos: revisiting oocyte development and application of systems biology. *Animal Reproduction*, 2015, 12(3): 465-472.
7. Mermillod P., Dalbiès-Tran R., Uzbekova S., Thélie A., Traverso J.M., Perreau C., Papillier P., Monget P. Factors affecting oocyte quality: who is driving the follicle? *Reproduction in Domestic Animals*, 2008, 43(2): 393-400 (doi: 10.1111/j.1439-0531.2008.01190.x).
8. Dalbiès-Tran R., Cadoret V., Desmarchais A., Elis S., Maillard V., Monget P., Monniaux D., Reynaud K., Saint-Dizier M., Uzbekova S. A comparative analysis of oocyte development in mammals. *Cells*, 2020, 9(4): 1002 (doi: 10.3390/cells9041002).
9. Matzuk M.M., Burns K.H., Viveiros M.M., Eppig J.J. Intercellular communication in the mammalian ovary: oocytes carry the conversation. *Science*, 2002, 296(5576): 2178-2180 (doi: 10.1126/science.1071965).
10. Hsueh A.J., Kawamura K., Cheng Y., Fauser B.C. Intraovarian control of early folliculogenesis. *Endocrine Reviews*, 2015, 36(1): 1-24 (doi: 10.1210/er.2014-1020).
11. Raposo G., Stoorvogel W. Extracellular vesicles: exosomes, microvesicles, and friends. *Journal of Cell Biology*, 2013, 200(4): 373-383 (doi: 10.1083/jcb.201211138).
12. Record M., Carayon K., Poirot M., Silvente-Poirot S. Exosomes as new vesicular lipid transporters involved in cell-cell communication and various pathophysiologicals. *Biochimica et Biophysica Acta*, 2014, 1841(1): 108-120 (doi: 10.1016/j.bbailip.2013.10.004).
13. Di Pietro C. Exosome-mediated communication in the ovarian follicle. *Journal of Assisted Reproduction and Genetics*, 2016, 33(3): 303-311 (doi: 10.1007/s10815-016-0657-9).
14. Tesfaye D., Hailay T., Salilew-Wondim D., Hoelker M., Bitscha S., Gebremedhn S. Extracellular vesicle mediated molecular signaling in ovarian follicle: Implication for oocyte developmental competence. *Theriogenology*, 2020, 150: 70-74 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2020.01.075).
15. Machtinger R., Laurent L.C., Baccarelli A.A. Extracellular vesicles: roles in gamete maturation, fertilization and embryo implantation. *Human Reproduction Update*, 2016, 22(2): 182-193 (doi: 10.1093/humupd/dmv055).
16. da Silveira J.C., de Ávila A.C.F.C.M., Garrett H.L., Bruemmer J.E., Winger Q.A., Bouma G.J. Cell-secreted vesicles containing microRNAs as regulators of gamete maturation. *Journal of Endocrinology*, 2018, 236(1): 15-27 (doi: 10.1530/JOE-17-0200).
17. da Silveira J.C., Andrade G.M., Del Collado M., Sampaio R.V., Sangalli J.R., Silva L.A., Pinaffi F.V.L., Jardim I.B., Cesar M.C., Nogueira M.F.G., Cesar A.S.M., Coutinho L.L., Pereira R.W., Perecin F., Meirelles F.V. Supplementation with small-extracellular vesicles from ovarian follicular fluid during *in vitro* production modulates bovine embryo development. *PLoS ONE*, 2017, 12(6): e0179451 (doi: 10.1371/journal.pone.0179451).
18. Giacomini E., Makieva S., Murdica V., Vago R., Vigany P. Extracellular vesicles as a potential diagnostic tool in assisted reproduction. *Current Opinion in Obstetrics and Gynecology*, 2020, 32(3):



- 179-184 (doi: 10.1097/GCO.0000000000000621).
19. Uzbekova S., Almicana C., Labas V., Teixeira-Gomes A.P., Combes-Soia L., Tsikis G., Carvalho A.V., Uzbekov R., Singina G. Protein cargo of extracellular vesicles from bovine follicular fluid and analysis of their origin from different ovarian cells. *Frontiers in Veterinary Science*, 2020, 7: 584948 (doi: 10.3389/fvets.2020.584948).
  20. Lebedeva I.Y., Singina G.N., Lopukhov A.V., Zinovieva N.A. Dynamics of morphofunctional changes in aging bovine ova during prolonged culture in vitro. *Cell and Tissue Biology*, 2014, 8(3): 258-266 (doi: 10.1134/S1990519X14030080).
  21. Miao Y.L., Kikuchi K., Sun Q.Y., Schatten H. Oocyte aging: cellular and molecular changes, developmental potential and reversal possibility. *Human Reproduction Update*, 2009, 15(5): 573-585 (doi: 10.1093/humupd/dmp014).
  22. Takahashi T., Igarashi H., Amita M., Hara S., Matsuo K., Kurachi H. Molecular mechanism of poor embryo development in postovulatory aged oocytes: mini review. *The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research*, 2013, 39(10): 1431-1439 (doi: 10.1111/jog.12111).
  23. Ahmed T.A., Ahmed S.M., El-Gammal Z., Shouman S., Ahmed A., Mansour R., El-Badri N. Oocyte aging: the role of cellular and environmental factors and impact on female fertility. *Advances in Experimental Medicine and Biology*, 2020, 1247: 109-123 (doi: 10.1007/5584\_2019\_456).
  24. Tarín J.J., Pérez-Albalá S., Pérez-Hoyos S., Cano A. Postovulatory aging of oocytes decreases reproductive fitness and longevity of offspring. *Biology of Reproduction*, 2002, 66(2): 495-499 (doi: 10.1095/biolreprod66.2.495).
  25. Jiang W.J., Yao X.R., Zhao Y.H., Gao Q.S., Jin Q.G., Li Y.H., Yan A.G., Xu Y.N. L-carnitine prevents bovine oocyte aging and promotes subsequent embryonic development. *The Journal of Reproduction and Development*, 2019, 65(6): 499-506 (doi: 10.1262/jrd.2019-046).
  26. Singina G.N., Shedova E.N., Lopukhov A.V., Mityashova O.S., Lebedeva I.Y. Delaying effects of prolactin and growth hormone on aging processes in bovine oocytes matured in vitro. *Pharmaceuticals*, 2021, 14(7): 684 (doi: 10.3390/ph14070684).
  27. Singina G.N., Shedova E.N., Uzbekov R.E., Uzbekova S. 135 Effect of different concentrations of follicular fluid exosome-like extracellular vesicles on in vitro oocyte maturation and embryo development in cattle. *Reproduction Fertility and Development*, 2021, 34(2): 305-306 (doi: 10.1071/RDv34n2Ab135).
  28. Asaadi A., Dolatabad N.A., Atashi H., Raes A., Van Damme P., Hoelker M., Hendrix A., Pascottini O.B., Van Soom A., Kafri M., Pavani K.C. Extracellular vesicles from follicular and ampullary fluid isolated by density gradient ultracentrifugation improve bovine embryo development and quality. *International Journal of Molecular Sciences*, 2021, 22(2): 578 (doi: 10.3390/ijms22020578).
  29. Godakumara K., Dissanayake K., Hasan M.M., Kodithuwakku S.P., Fazeli A. Role of extracellular vesicles in intercellular communication during reproduction. *Reproduction in Domestic Animals*, 2022, 57(5): 14-21 (doi: 10.1111/rda.14205).
  30. Almicana C., Corbin E., Tsikis G., Alcántara-Neto A.S., Labas V., Reynaud K., Galio L., Uzbekov R., Garanina A.S., Druart X., Mermillod P. Oviduct extracellular vesicles protein content and their role during oviduct-embryo cross-talk. *Reproduction*, 2017, 154(3): 153-168 (doi: 10.1530/REP-17-0054).
  31. Alcántara-Neto A.S., Schmaltz L., Caldas E., Blache M.C., Mermillod P., Almicana C. Porcine oviductal extracellular vesicles interact with gametes and regulate sperm motility and survival. *Theriogenology*, 2020, 155: 240-255 (doi: 10.1016/j.theriogenology.2020.05.043).
  32. By G.A., Mapletoft R.J. Evaluation and classification of bovine embryos. *Animal Reproduction*, 2013, 10(3): 344-348.
  33. Prasad S., Tiwari M., Koch B., Chaube S.K. Morphological, cellular and molecular changes during postovulatory egg aging in mammals. *Journal of Biomedical Science*, 2015, 22(1): 36 (doi: 10.1186/s12929-015-0143-1).
  34. Di Nisio V., Antonouli S., Damdimopoulou P., Salumets A., Cecconi S., SIERR. In vivo and in vitro postovulatory aging: when time works against oocyte quality? *Journal of Assisted Reproduction and Genetics*, 2022, 39(4): 905-918 (doi: 10.1007/s10815-022-02418-y).

<sup>1</sup>ФГБНУ Федеральный исследовательский центр  
животноводства — ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста,  
142132 Россия, Московская обл., г.о. Подольск, пос. Дубровицы, 60,  
e-mail: shedvek@yandex.ru, g\_singina@mail.ru ✉, kristybatle@gmail.com,  
vip.krilochkina@mail.ru;

<sup>2</sup>Physiology of Reproduction and Behavior unit,  
INRAE, CNRS, IFCE, Tours University,  
37380 Nouzilly, France, e-mail svetlana.uzbekova@inrae.fr;

<sup>3</sup>Laboratory of Cell Biology and Electron Microscopy,  
Faculty of Medicine, University of Tours,

Поступила в редакцию  
12 сентября 2022 года

10 bd Tonnelle, Tours, 37032, France,  
e-mail: rustem.uzbekov@univ-tours.fr;

<sup>4</sup>ФГБОУ ВО Московский государственный университет

им. М.В. Ломоносова,

Факультет биоинженерии и биоинформатики,

119234 Россия, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, 1, стр. 3

*Sel'skokhozyaystvennaya biologiya [Agricultural Biology]*, 2022, V. 57, № 6, pp. 1178-1187

## EFFECT OF EXTRACELLULAR VESICLES OF FOLLICULAR ORIGIN DURING *in vitro* MATURATION AND AGEING OF BOVINE OOCYTES ON EMBRYO DEVELOPMENT AFTER *in vitro* FERTILIZATION

*E.N. Shedova<sup>1</sup>, G.N. Singina<sup>1</sup> ✉, S. Uzbekova<sup>2</sup>, R. Uzbekov<sup>3, 4</sup>, V.A. Lukanina<sup>1</sup>, E.V. Tsyndrina<sup>1</sup>*

<sup>1</sup>*Ernst Federal Research Center for Animal Husbandry, 60, pos. Dubrovitsy, Podolsk District, Moscow Province, 142132 Russia, e-mail shedvek@yandex.ru, g\_singina@mail.ru (✉ corresponding author), kristybatle@gmail.com, vip.krilochnikina@mail.ru;*

<sup>2</sup>*Physiology of Reproduction and Behavior unit, INRAE, CNRS, IFCE, Tours University, 37380 Nouzilly, France, e-mail svetlana.uzbekova@inrae.fr;*

<sup>3</sup>*Laboratory of Cell Biology and Electron Microscopy, Faculty of Medicine, University of Tours, 10 bd Tonnelle, Tours, 37032, France, e-mail rustem.uzbekov@univ-tours.fr;*

<sup>4</sup>*Faculty of Bioengineering and Bioinformatics, Lomonosov Moscow State University, 1-73, Leninskiye Gory, GSP-1, Moscow, 19234 Russia*

ORCID:

Shedova E.N. [orcid.org/0000-0002-9642-2384](https://orcid.org/0000-0002-9642-2384)

Singina G.N. [orcid.org/0000-0003-0198-9757](https://orcid.org/0000-0003-0198-9757)

Uzbekova S. [orcid.org/0000-0002-6989-6904](https://orcid.org/0000-0002-6989-6904)

The authors declare no conflict of interests

Acknowledgements:

Supported financially by the Russian Science Foundation (project No. 19-16-00115-П)

Received September 12, 2022

Uzbekov R. [orcid.org/0000-0002-9336-5484](https://orcid.org/0000-0002-9336-5484)

Lukanina V.A. [orcid.org/0000-0003-4744-7873](https://orcid.org/0000-0003-4744-7873)

Tsyndrina E.V. [orcid.org/0000-0002-3263-2358](https://orcid.org/0000-0002-3263-2358)

doi: 10.15389/agrobiology.2022.6.1178eng

### Abstract

Extracellular vesicles (EVs) isolated from ovarian follicular fluid (FF) are involved *in vivo* in the regulation of meiosis in female gametes. Recent studies suggested follicular EVs as potential regulators of oocyte quality capable to increase the efficiency of embryo production technologies *in vitro* (*in vitro* embryo production, IVP). In this work for the first time, we have analyzed embryo development competence of bovine oocytes after *in vitro* maturation (IVM) in the presence of EVs and ageing before *in vitro* fertilization. The aim of the study was to determine the effects of these conditions to oocyte ageing-related transformations during IVM in terms of their ability to develop blastocysts, as well as the quality of IVP embryos. The EVs were separated from FF by serial centrifugations and final ultracentrifugation at 100,000g. The isolated EV fraction contained 37.5 µg of total protein per ml of FF. Isolated vesicular fractions were analyzed using transmission electron microscopy that confirmed their enrichment in exosome-like EVs. For functional experiments, cumulus-oocyte complexes (COCs) were *in vitro* matured in TC-199 medium containing 3 mg/ml of bovine serum albumin, 0.5 mM sodium pyruvate and 100 ng/ml EGF in the absence (control) or presence of EVs. Vesicles were added to IVM culture at the physiological concentration (EVs isolated from 1 ml of FF were added to 1 ml of IVM medium). After 24 hours of maturation, COCs were transferred to an ageing medium, cultured for further 12 hours, then *in vitro* fertilized and cultured for embryo development. At day 3 after *in vitro* fertilization, morphological evaluation of cleaved oocytes was carried out, and at day 7, the number of embryos developed to blastocyst stage and their quality were evaluated. The number of nuclei per embryo, calculated using the cytological method, served as an assessment of the quality of the embryo. In four independent experiments performed, the number of COCs in each group varied from 116 to 121. The cleavage rate of control oocytes was lower than that in the experimental EVs group (53.5 ± 2.9 vs. 63.8 ± 2.9 %, respectively,  $p < 0.05$ ). In addition, EVs had a positive effect on embryo development up to the blastocyst stage after IVM and aging of the oocytes. In control, blastocyst rate was 17.3 ± 1.6 %, and the presence of EVs during IVM increased this rate to 20.2 ± 2.5 % ( $p < 0.05$ ), whereas quality of produced embryos did not change. According to the reported data, EVs from follicular fluid added during IVM may increase the resistance of bovine oocytes to age transformations and, consequently, improve oocyte competence to embryo development after aging *in vitro*. Therefore, EVs can improve extracorporeal oocyte maturation and the efficiency of *in vitro* embryo production techniques in cattle.

Keywords: extracellular vesicles, bovine follicular fluid, bovine oocytes, *in vitro* maturation, oocyte aging, embryo development.